

# ZALECENIA DLA PACJENTA

## GASTROSKOPIA

zaplanowana w godzinach popołudniowych

W Pracowni Endoskopowej w naszej klinice przeprowadzamy badania z zakresu diagnostyki oraz leczenia zmian przewodu pokarmowego. Pracownia dysponuje doświadczonym personelem, wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt endoskopowy, akcesoria jednorazowego użytku, diatermię z bimerem argonowym do koagulacji popromiennych zmian naczyniowych i do drobnych zabiegów endoskopowych i chirurgicznych.

**GASTROSKOPIA** jest badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego tj. gardła, przełyku, żołądka i dwunastnicy (również z badaniem w kierunku zakażenia *Helicobacter pylori* i pobraniem wycinków do badania histopatologicznego).

### PRZYGOTOWANIE

#### 7 dni przed badaniem:

##### W LABORATORIUM:



do gastroskopii w znieczuleniu **wskazane**:

- Morfologia krwi
- Jonogram
- APTT + PT

#### w dniu badania w godzinach porannych:



- w dniu badania w godzinach porannych spożyć lekkie śniadanie (unikając produktów nabiałowych) oraz zażyć poranną dawkę na stałe zleconych leków, zwłaszcza kardiologicznych.



#### 4-5h przed badaniem:



- 4-5 godzin przed **badaniem nie spożywać posiłków, nie pić płynów, nie zażywać leków**



- **konieczna obecność osoby towarzyszącej**
- Pacjent po badaniu nie może prowadzić pojazdów mechanicznych

### PRZYJMOWANE LEKI



- nie zażywać przed badaniem na stałe zleconych leków
- nie ma konieczności do badania diagnostycznego odstawiania leków przeciwplatek i przeciwzakrzepowych (w przypadku heparyn pomijamy poranną dawkę)
- wskazane odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej co najmniej na tydzień przed planowanym badaniem celem uwiarygodnienia badania na *Helicobacter pylori*

### UWAGA

PLANOWA GASTROSKOPIA NIEWSKAZANA W PRZYPADKU CZYNNEJ INFЕКCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB NIEDAWNO PRZEBYTEJ.

### MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami.

Z przyjemnością  
NA WSZYSTKIE  
ODPOWIEMY.

77 300 00 88



**MEDIN**  
KLINIKA

[www.medinklinika.com](http://www.medinklinika.com)  
ul. Częstochowska 54  
45-424 Opole

4-5 godzin przed badaniem **nie spożywać posiłków, nie pić płynów, nie zażywać leków**

